

# Positionering - centrering - indblænding

(+ præsentation)



## HD

Én ventro-dorsal optagelse

### **Positionering:**

Columna skal være i tæt kontakt med underlaget

Pelvis skal være symmetrisk (tjek de to foramina)

Bagbenene skal være parallelle

Knæene skal være pronerede

Knæene skal være i kontakt med underlaget

Der **centreres** på kanten af ischium

Der **indblændes**, så optagelsen inkluderer pelvis og begge knæled

## AD

Én medio-lateral optagelse af hvert led

Obs. Uden raster

**Positionering:** Den laterale og mediale del af kondylen skal være projiceret ovenpå hinanden og leddet flekteret 45 – 60°

Der **centreres** på den mediale epikondyl

Der **indblændes**, så **kun** albueleddet er med på optagelsen

## OCD

Én medio-lateral optagelse af hvert led

Obs. Anvend raster ved objektykkelse >10 cm

**Positionering:** Det aktuelle forben tækkes cranio-ventralt, samtidig med at hoved og hals skubbes let dorsalt, og det modstående forben trækkes caudo-dorsalt

**Centrering:** Tuberculum major lokaliseres ved palpation, og der centreres caudalt herfor

Der **indblændes**, så **kun** skulderleddet er med på optagelsen

# Test af positionering

